

EP 287477

DIALOG(R)File 351:Derwent WPI
(c) 2005 Thomson Derwent. All rts. reserv.

007660899

WPI Acc No: 1988-294831/*198842*

XRAM Acc No: C88-130646

Non-anticoagulant heparin analogues - useful for treating vascular disease, shock, metastasis, thrombosis, etc.

Patent Assignee: SANOFI SA (SNFI); ELF SANOFI (SNFI)

Inventor: CHOAY J; LORMEAU J; PETITOU M; LORMEAU J C

Number of Countries: 023 Number of Patents: 016

Patent Family:

Patent No	Kind	Date	Applicat No	Kind	Date	Week
EP 287477	A	19881019	EP 88400928	A	19880415	198842 B
FR 2614026	A	19881021	FR 875457	A	19870416	198849
AU 8814663	A	19881020				198850
NO 8801660	A	19881107				198850
JP 63278901	A	19881116	JP 8891891	A	19880415	198901
ZA 8802662	A	19881130	ZA 882662	A	19880415	198902
DK 8802103	A	19881017				198903
FI 8801783	A	19881017				198906
PT 87261	A	19890512				198923
US 4990502	A	19910205	US 88181969	A	19880415	199108
FI 88046	B	19921215	FI 881783	A	19880415	199304
CA 1327968	C	19940322	CA 564296	A	19880415	199417
EP 287477	B1	19941102	EP 88400928	A	19880415	199442
DE 3851973	G	19941208	DE 3851973	A	19880415	199503
			EP 88400928	A	19880415	
IE 64884	B	19950920	IE 881150	A	19880415	199546
DK 173982	B	20020325	DK 882103	A	19880418	200223

Priority Applications (No Type Date): FR 875457 A 19870416

Cited Patents: 2.Jnl.Ref; A3...8930; BE 620906; EP 208623; No-SR.Pub

Patent Details:

Patent No	Kind	Lan	Pg	Main IPC	Filing Notes
EP 287477	A	F	19		
Designated States (Regional): AT BE CH DE ES FR GB GR IT LI LU NL SE					
FI 88046	B			C08B-037/10	Previous Publ. patent FI 8801783
CA 1327968	C	F		C08B-037/10	
EP 287477	B1	F	34	C08B-037/10	
Designated States (Regional): AT BE CH DE ES FR GB GR IT LI LU NL SE					
DE 3851973	G			C08B-037/10	Based on patent EP 287477
IE 64884	B			C08B-037/10	
DK 173982	B			C08B-037/10	Previous Publ. patent DK 8802103

Abstract (Basic): EP 287477 A

Low-molecular-wt. heparin compsns. comprising fragments of formula R-(X-Y)n-R' (I), with no non-sulphated uronic acid/glucosamine N-sulphate disaccharide chains, are new.

X = a sulphated iduronic acid unit of formula (II) or a 2,3-cleaved non-sulphated D-glucuronic or L-iduronic acid unit of formula (III), provided that (III), provided than no more than 1 unit of formula (III) is present for every two chains: Y = a D-glucosamine

BEST AVAILABLE COPY

unit of formula (IV): R1 = H or SO3-; R2 = SO3- or COMe, at least 90% being SO3(-); R3 = H or SO3-, at least 70% being SO3(-); R = H or a glucosamine unit of formula (V): R4 = H or a uronic acid residue; R' H or a uronic acid residue opt. modified by periodate oxidn. and redn. of CHO to CH2OH; n = 7-15, giving a mol.wt. of 4800-9000.

USE/ADVANTAGE - (I) are heparin analogues with little or no anticoagulant activity which inhibit growth of smooth muscle cells, inhibit complement activation, suppress delayed hypersensitivity inflammatory reactions, inhibit heparinase, and potentiate and stabilise the activity of certain growth factors. They may be used to prevent angioplastic smooth-muscle proliferation, accelerate tissue repair (esp. in skin diseases), inhibit extension of atherogenic lesions and arteriosclerotic degeneration, prevent shock states, inhibit metastasis and prevent thrombosis.

Title Terms: NON; ANTICOAGULANT; HEPARIN; ANALOGUE; USEFUL; TREAT; VASCULAR ; DISEASE; SHOCK; METASTASIS; THROMBOSIS

Derwent Class: B04; P34

International Patent Class (Main): C08B-037/10

International Patent Class (Additional): A61K-031/72; A61K-031/725;

A61L-033/00; C07H-007/02; C07H-011/00; C08L-005/10

File Segment: CPI; EngPI

⑫

DEMANDE DE BREVET EUROPEEN

⑮ Numéro de dépôt: 88400928.3

⑥ Int. Cl. 4: **C 08 B 37/10**
A 61 K 31/725

⑰ Date de dépôt: 15.04.88

⑲ Priorité: 16.04.87 FR 8705457

⑳ Date de publication de la demande:
19.10.88 Bulletin 88/42

㉑ Etats contractants désignés:
AT BE CH DE ES FR GB GR IT LI LU NL SE

㉒ Demandeur: **SANOFI**
40, Avenue George V
F-75008 Paris (FR)

㉓ Inventeur: **Lormeau, Jean-Claude**
34 rue du 8 mai
F-76150 Maromme (FR)

Petitou, Maurice
Tour Mexico 65 rue du Javelot
F-75845 Paris Cedex 13 (FR)

Choay, Jean
21 rue St-Guillaume
F-75007 Paris (FR)

㉔ Mandataire: **Peaucelle, Chantal et al**
S.C. Ernest Gutmann - Yves Plasseraud 67, boulevard
Hausmann
F-75008 Paris (FR)

㉕ **Héparines de bas poids moléculaire à structure régulière leur préparation et leurs applications biologiques.**

㉖ Les compositions de l'invention sont formées de fragments d'héparine renfermant essentiellement des enchaînements disaccharidiques correspondant aux régions régulières de l'héparine et possédant un PM de 4800 à 9000. Ces compositions sont utilisables pour la régulation des systèmes physiologiques.

Description


**HEPARINES DE BAS POIDS MOLECULAIRE A STRUCTURE REGULIERE
LEUR PREPARATION ET LEURS APPLICATIONS BIOLOGIQUES**

L'invention a pour objet des héparines de bas PM à structure régulière, leur procédé de préparation et leurs applications biologiques.

Elle vise plus spécialement des héparines de bas PM présentant une activité dans le domaine de la régulation de certains systèmes physiologiques tout en étant pratiquement totalement dépourvues de l'activité anticoagulante s'exerçant via l'antithrombine III (ATIII).

Il est connu que l'héparine possède une activité anticoagulante s'exerçant principalement via l'antithrombine III (ATIII).

Les travaux effectués sur les relations structure/activité de l'héparine ont montré que ce type d'activité anticoagulante se trouve tout particulièrement corrélée aux régions dites irrégulières de l'héparine, plus spécialement la région correspondant au pentasaccharide de structure DEFGH, décrit dans la demande FR 2.535.324, de formule :



On sait également que certaines activités de l'héparine ou de fragments d'héparine peuvent être maintenues jusqu'à un certain degré en l'absence du site de liaison à l'AT III ou lorsque celui-ci est modifié, les structures responsables de telles activités n'étant cependant pas connues.

Ainsi Folkman et al (Science Vol. 221 - 1983 - p. 719-725) ont rapporté une action inhibitrice de l'angiogénèse pour des mélanges d'hexasaccharides dépourvus d'activité anticoagulante, utilisés en association avec des corticoïdes.

Karnowsky et al ont effectué des expériences sur des héparines O-désulfatées et N-désulfatées et ont montré qu'elles possédaient toujours dans une certaine proportion, mais à un moindre degré, les activités inhibitrices de l'héparine standard sur la prolifération des cellules musculaires lisses.

En outre, une activité anti-complément de l'héparine, indépendante de l'activité anticoagulante, a été mise en évidence.

D'autres travaux ont montré que l'activité anticoagulante de l'héparine pouvait être modifiée en effectuant des coupures au niveau des carbones C₂-C₃ des acides uroniques non sulfatés à l'aide de periodate de sodium.

Ainsi, Fransson et Lewis ont décrit, dans Febs. Letters, vol. 97, n° 1, p. 119 - 123, 1979, des conditions opératoires consistant à soumettre l'héparine à l'action du periodate, soit à pH 3, à 4° C, soit à pH 7, à 37° C. Les chaînes d'héparine obtenues sont oxydées sélectivement au niveau des acides D-glucuronique dans le premier cas, alors qu'une oxydation au niveau de tous les motifs acides uroniques non sulfatés est obtenue avec le deuxième type de conditions.

Les chaînes résultantes sont réduites par NaBH₄ ou fragmentées selon un processus de β élimination en milieu alcalin.

Les auteurs concluent que l'oxydation et le clivage des motifs acide D-glucuronique se traduisent par une légère diminution de poids moléculaire mais une rétention de l'activité anticoagulante.

Au contraire, la coupure à pH 7 et à 37° C des acides D-glucuronique et L-iduronique non sulfatés entraîne la suppression de l'activité anticoagulante et une plus forte fragmentation de la molécule.

Dans un article paru dans Carbohydrate Research 36, p. 339-348, 1974, Fransson a rapporté l'oxydation périodique des motifs uroniques dans le dermatane sulfate à divers pH, à 4° C ou 37° C.

L'auteur indique qu'en procédant à pH 5, les coupures au niveau des acides glucuroniques ne se font que dans une proportion inférieure à 5% et qu'en procédant à pH 3, ces coupures ne se font pas du tout. Ces résultats apparaissent donc contraires à ceux obtenus avec l'héparine pour laquelle à pH 3, les coupures se font préférentiellement au niveau des acides D-glucuroniques.

L'action du periodate a également été rapportée par Casu et al. dans Arzheim. Forsch./Drug Res. 36 (1) n° 4, p. 637-642, 1986.

Selon cet article, différentes préparations d'héparine sont soumises à une oxydation périodique (pH 5,3 à 4° C durant 24 h.) coupant entre les carbones en positions 2 et 3 de tous les acides uroniques non sulfatés. A titre de référence, une préparation est soumise à une étape ultérieure d'hydrolyse acide partielle et les fragments obtenus sont dialysés.

Cette étape d'hydrolyse acide partielle conduit à une fragmentation importante des chaînes et à une destruction au moins partielle de groupes fonctionnels, comme l'indique Fransson dans Carbohydr. Res. 80, 131-145 (1980).

De plus, selon cette méthode, on obtient obligatoirement un mélange de chaînes de PM variés dans un intervalle large, en particulier de nombreux di, tetra et hexasaccharides.

Or, les inventeurs ont mis en évidence que pour l'obtention de compositions pharmaceutiques stables, utilisables en thérapeutique pour la régulation de certains systèmes physiologiques, les caractéristiques suivantes, en combinaison, sont essentielles :

longueur des fragments; taux de charge; absence du site de liaison à l'ATIII, afin d'éviter les effets indésirables liés à une activité anticoagulante.


L'étude des processus de coupure à l'aide d'acide periodique et des moyens de fragmentation les ont conduits à constater qu'en réalisant l'oxydation periodique dans des conditions opératoires spécifiques, mais également en mettant en oeuvre une combinaison d'étapes particulières, il est possible d'obtenir une composition de fragments d'héparine de bas PM, mais dans un intervalle favorable, dépourvus du site de liaison à l'ATIII et ce, tout en conservant au moins la majeure partie de leurs groupes fonctionnels.

L'invention a donc pour but de fournir des compositions d'héparine qui, aux doses actives, solent dotées de propriétés pharmacologiques de grand intérêt, sensiblement équivalentes à celles de l'héparine, sans présenter les inconvénients d'être dotées de propriétés anticoagulantes.

Elle vise également à fournir un procédé de fragmentation de l'héparine permettant d'obtenir des fragments de PM donné, dépourvus cependant du site de liaison à l'ATIII et dont le taux de charge correspond sensiblement à celui des séquences correspondantes dans les chaînes d'héparine naturelle.


L'invention vise également les applications de ces compositions pour l'élaboration de médicaments actifs notamment sur la régulation de certains systèmes physiologiques.

Les compositions de l'invention sont caractérisées par le fait qu'elles sont essentiellement formées de fragments dépourvus d'enchaînements disaccharidiques du type acide uronique non sulfaté-glucosamine N-sulfate, ces fragments répondant à la formule générale I suivante :




dans laquelle

- X représente soit un motif acide iduronique sulfaté de formule II :




(II)

soit, à raison de 1 motif pour 2 chaînes au moins, un motif acide uronique (D-glucuronique ou L-iduronique) non sulfaté ouvert entre les carbones en positions 2 et 3, de formule III :




(III)

- Y représente un motif D-glucosamine de formule IV :



- 15
- . R₁ étant un atome d'hydrogène ou un groupe -SO₃⁻
 - . R₂, un groupe -SO₃⁻ ou -CO-CH₃, la proportion des groupes -SO₃⁻ étant d'environ au moins 90%, et
 - . R₃, étant un groupe -SO₃⁻ ou un atome d'hydrogène, la proportion des groupes -SO₃⁻ étant d'environ au moins 70%,
 - R représente un atome d'hydrogène ou un motif :



- 35
- . R₁ à R₃ étant tels que définis ci-dessus, et
 - . R₄ représentant un atome d'hydrogène ou un résidu d'acide uronique,
 - R' représente soit un atome d'hydrogène, soit un motif acide uronique naturel, soit un résidu d'acide uronique modifié au cours de l'oxydation periodique et dont les fonctions aldéhydes ont été réduites en alcools,
- 40
- avec $7 \leq n \leq 15$ pour les espèces majoritaires, ce qui correspond à des chaînes de PM de 4800 à 9000 environ, et ses sels pharmaceutiquement acceptables.

On notera que les motifs X ouverts sont des motifs qui, au cours de l'étape de bêta-élimination en pH alcalin, sont restés intégrés dans l'enchaînement glycosamino-glycanique. Il s'agit soit d'un acide D-glucuronique non sulfaté, soit d'acide L-iduronique non sulfaté, dont les liaisons entre les carbones en positions 2 et 3 ont été coupées.

45

Les compositions de l'invention telles que caractérisées en HPLC déterminée avec une colonne TSK 2000 SW couplée à un détecteur photométrique à 205 nm, en utilisant Na₂SO₄ 0,5M comme solvant, avec un débit de 1 ml/min, présentent :

- 50
- un poids moléculaire moyen de l'ordre de 6000-7000 Da, plus précisément de 5800 à 7000 Da, notamment de l'ordre de 6000 Da, 70% des espèces étant compris entre 4800 et 9000 daltons et 90% entre 3600 et 11000 Da,
 - un poids moléculaire au sommet du pic de l'ordre de 5500 à 6500 Da, plus précisément de 5500 à 6500 Da, notamment de l'ordre de 5500 à 6000 Da,
 - moins de 5% de chaînes inférieures à des dodécasaccharides,
 - moins de 5% de chaînes au-delà de 11.000.

55

Selon un autre aspect, les compositions d'héparine de l'invention sont telles qu'obtenues par fractionnement, à l'aide d'alcool, en présence d'un sel minéral, d'un mélange résultant de la dépolymérisation de l'héparine par action d'une base forte sur des chaînes d'héparine soumises au préalable à l'action de periodate, la dépolymérisation étant suivie d'une réduction des groupements aldehyde formés lors de l'oxydation periodique.

60

D'une manière avantageuse, les compositions de l'invention présentent un rapport des taux de groupes sulfate SO₃⁻ et de groupes carboxyle COO⁻ par mole compris entre 2,2 et 2,8. Ce rapport est notamment de 2,4. Ce taux élevé par rapport aux valeurs moyennes des chaînes d'héparine résulte de la structure des chaînes d'héparines de bas poids moléculaire selon l'invention, qui sont constituées pour l'essentiel d'unités disaccharidiques trisulfatées. Ces héparines de bas PM sont dites à structure régulière compte tenu de la présence de ces unités disaccharidiques et en référence à la littérature scientifique (PERLIN A.S., CASU, B.

65

SANDERSON, GR. "220 MHz spectra of heparin, chondroitins and other mucopolysaccharides". Can. J. Chem. 1970; 48:2260-8).

L'invention vise également les sels de ces compositions, en particulier les sels de sodium, potassium, calcium et magnésium ainsi que les sels de cations organiques physiologiquement acceptables.

L'invention a également pour objet un procédé de préparation de compositions de fragments d'héparine tels que définis ci-dessus, comprenant l'oxydation ménagée de l'héparine à l'aide de periodate.

Le procédé de la présente invention est caractérisé en ce que :

a) on traite une solution aqueuse d'héparine à une concentration finale de 0,5 à 5% (p/v) avec de l'acide periodique à une concentration finale de 0,5 à 4% (p/v), à un pH de 4,5 à 6,5, à une température de 0 à 10° C;

b) on traite les chaînes d'héparine ainsi obtenues avec une base forte, à un pH supérieur à 11 environ;

c) on traite les fragments de dépolymérisation ainsi obtenus avec un agent réducteur;

d) après élimination éventuelle de l'agent réducteur en excès, on précipite les fragments réduits, après addition d'un sel minéral, à l'aide d'un solvant alcoolique;

e) on traite une solution aqueuse du précipité ainsi obtenu additionné d'un sel minéral par de l'alcool pour éliminer les fragments de très bas poids moléculaire;

f) on récupère le produit précipité ainsi formé et on transforme, éventuellement, le sel correspondant à la base forte utilisée, en un autre sel pharmaceutiquement acceptable.

On notera que l'étape e correspond à un fractionnement afin d'éliminer certains chaînes et non à une précipitation globale.

Plus particulièrement, ce procédé comprend en combinaison les étapes suivantes :

- l'oxydation ménagée de l'héparine réalisée en faisant réagir de l'héparine, en solution aqueuse à une concentration finale de 0,5 à 5% (p/v) avec un sel de l'acide periodique à une concentration finale de 0,5 à 4% (p/v), à un pH situé entre 4,5 et 6,5, de préférence à un pH de 5, à une température de 0 à 10° C, durant environ 15 à 48 h, à l'abri de la lumière,

- la dépolymérisation des chaînes d'héparine obtenues, par addition d'une base forte telle que la soude, à un pH supérieur à 11 environ, notamment compris entre 11 et 12, avantageusement de 11,2 à 11,6 de préférence aux environs de 11,5;

- la réduction des fragments de dépolymérisation à l'aide d'un agent réducteur et, après élimination, le cas échéant, de l'agent réducteur n'ayant pas réagi,

- la récupération des fragments d'héparine réduits, par précipitation à l'aide d'un solvant dans lequel ils sont insolubles,

- l'isolement des fragments recherchés par fractionnement à l'aide d'alcool, en présence d'un sel minéral, d'une solution aqueuse obtenue en remettant en solution dans l'eau le précipité précédemment isolé et en récupérant le précipité formé.

La réalisation de la dépolymérisation suivant un processus particulier, combinée à l'utilisation dans le procédé de l'invention, d'une étape de fractionnement, permet d'isoler une composition de fragments répondant à un profil thérapeutique particulier et possédant notamment un indice thérapeutique satisfaisant.

Dans l'étape d'oxydation periodique, on utilise de préférence, l'héparine et le sel de l'acide periodique selon des quantités conduisant à des concentrations finales respectives de 1,5 à 5% et de 1,5 % à 2,5 % (p/v).

Le sel de l'acide periodique est constitué avantageusement par du métaperiodate de sodium.

Pour éliminer le periodate résiduel, on effectue une dialyse avec des boyaux de dialyse ayant une porosité de 3 à 4000 Da, pendant environ 15 h.

On peut également procéder par chromatographie sur résine échangeuse d'anions par exemple sur une résine telle que celle commercialisée sous la marque Amberlite IRA 400, cette résine étant utilisée en quantité suffisante pour retenir le periodate résiduel et les dérivés du periodate formés au cours de la réaction, soit 1/8 à 1/8 du volume réactionnel par exemple. Cette procédure plus rapide que la dialyse, de grande reproductibilité, permet de procéder à la bêta-élimination à partir de conditions facilement standardisées.

Selon un mode préféré de réalisation de l'invention, on met l'héparine en solution dans de l'eau, plus spécialement de l'eau déminéralisée, à 4° C, à une concentration d'environ 5% (p/v), on ajoute un sel d'acide periodique tel que du métaperiodate de sodium de manière à obtenir une concentration finale d'environ 2% (p/v). Le pH de la solution est immédiatement ajusté à 5 à l'aide d'acide chlorhydrique dilué ou de soude diluée.

La solution est abandonnée à l'obscurité, à + 4° C, de préférence 24 heures.

Afin d'éliminer le periodate résiduel, on effectue une dialyse avec des boyaux de dialyse ayant une porosité de 3 à 4000 Da, pendant environ 15 heures, contre de l'eau déminéralisée courante.

Les chaînes d'héparine obtenues sont soumises à une étape de dépolymérisation en milieu basique.

A cet effet, on ajoute une base forte, plus spécialement une lessive concentrée de soude, de manière à obtenir une molarité finale en base de 0,2 N.

La solution basique obtenue est soumise à agitation 2 heures à température ambiante.

On soumet alors les fragments de dépolymérisation de l'héparine à une étape de réduction afin de transformer les groupes aldéhyde résultant de la coupure de la liaison entre les carbones C₂ et C₃ des motifs uroniques.

On utilise un agent réducteur tel que le borohydrure de sodium, à raison de 50 mg par gramme d'héparine engagée, et on maintient l'agitation 6 heures à température ambiante.

L'agent réducteur n'ayant pas réagi est détruit par abaissement du pH à 4 à l'aide d'acide, par exemple de l'acide chlorhydrique, avantageusement sous agitation vigoureuse, pendant environ 15 minutes.

Les fragments d'héparine réduits sont récupérés par précipitation.

5 Avantageusement, on ajuste le pH à 7 à l'aide d'une base, notamment de la soude concentrée, puis on ajoute 20 g/litre de sel minéral et on effectue une précipitation à l'aide de 1,5 volume d'alcool.

Le sel minéral utilisé est avantageusement constitué par du chlorure de sodium. Pour la précipitation alcoolique, on a recours de préférence à de l'éthanol.

Le précipité formé est récupéré par centrifugation, lavé avec un solvant dans lequel il est insoluble, tel que l'éthanol, et séché à 40° C, sous vide.

10 Pour isoler de ce précipité les fragments de l'invention, on a recours à une étape de fractionnement.

On réalise avantageusement un fractionnement alcoolique en procédant comme suit :

Le précipité de fragments d'héparine est remis en solution dans de l'eau, plus spécialement de l'eau déminéralisée, à température ambiante à savoir de l'ordre de 18 à 20° C, de manière à obtenir une concentration de 5% (p/v).

15 On ajoute un sel minéral, tel que le chlorure de sodium, en quantité suffisante pour avoir une concentration finale de 1%. Le pH de la solution est ajusté à 3,5 par de l'acide, par exemple de l'acide chlorhydrique dilué.

On ajoute alors sous agitation modérée 0,85 volume d'un solvant dans lequel les fragments recherchés sont insolubles, tel que l'éthanol.

L'ensemble est laissé au repos environ 10 heures à 18-20° C.

20 Le précipité est recueilli par centrifugation, lavé avec un solvant tel que l'éthanol et séché sous vide à 40° C pendant 24 heures.

Ce précipité peut éventuellement être soumis à une étape de purification supplémentaire, après remise en solution dans de l'eau déminéralisée, par une chromatographie sur une résine échangeuse d'anions, telle qu'une résine Amberlite IRA 400, OH⁻ ayant un volume de l'ordre du 1/10 du volume réactionnel, afin d'éliminer d'éventuelles impuretés.

25 Il est constitué d'un mélange de fragments d'héparine dont la majorité des espèces a un PM compris entre 4800 à 9000 Da environ.

Le produit ainsi obtenu peut, le cas échéant, être transformé en un autre sel pharmaceutiquement acceptable, tel qu'un sel de calcium, un sel de potassium ou un sel de magnésium, selon les méthodes connues.

30 Les compositions d'héparine de l'invention, essentiellement formées de fragments de poids moléculaire d'environ 4800 à 9000, dépourvus du site de liaison à l'ATIII, permettent de mettre à profit des propriétés pharmacologiques de grand intérêt, qui sont rattachées aux régions régulières de l'héparine. Ces compositions aux doses actives n'ont qu'une très faible activité anti-coagulante.

35 L'étude de leurs propriétés pharmacologiques a ainsi montré que ces compositions exercent un effet inhibiteur sensiblement équivalent à celui de l'héparine sur la croissance des cellules musculaires lisses.

Diverses expériences ont permis de mettre en évidence d'autres effets inhibiteurs, en particulier vis-à-vis de l'activation du complément, et des réactions inflammatoires d'hypersensibilité de type retardé, ainsi que vis-à-vis de l'activité enzymatique de l'héparanase.

40 Elles peuvent exercer également une action potentialisatrice et stabilisante vis-à-vis de certains facteurs de croissance cellulaire.

Ces compositions sont, en outre, dotées d'une grande innocuité et sont particulièrement stables.

Elles sont ainsi particulièrement appropriées pour constituer des principes actifs de médicaments.

45 L'invention a donc pour objet des préparations pharmaceutiques caractérisées en ce qu'elles renferment une quantité efficace d'une composition essentiellement formée de fragments d'héparine, tels que définis ci-dessus, en association avec un véhicule pharmaceutique.

Compte tenu de leurs propriétés, les médicaments de l'invention sont utilisables tout spécialement dans les indications thérapeutiques suivantes :

- prévention de la prolifération des cellules musculaires lisses au cours des angioplasties,
- accélération de la réparation tissulaire, notamment lors de maladies cutanées,
- 50 - prévention de l'extension de lésions athérogènes évolutives et des phénomènes de dégénérescence artériosclérotique,
- prévention des états de chocs,
- prévention de certains développements métastatiques.

Les préparations pharmaceutiques de l'invention sont administrables sous différentes formes.

55 Pour l'administration par voie orale, on a recours en particulier à des gélules, tablettes, comprimés, pilules, liposomes. Ces préparations renferment avantageusement de 50 mg à 5 g par unité de prise, de préférence 200 à 250 mg pour les gélules, tablettes et pilules.

En conséquence, les formes d'administration dépendent essentiellement de la dose à administrer. Les gélules, tablettes et pilules seront d'une utilisation pratique pour l'administration de faibles doses. Pour 60 l'administration de doses plus élevées, les solutés buvables pourront être d'une utilisation plus pratique.

D'autres formes d'administration de l'invention sont constituées par des sprays, des aérosols, des pommades ou des crèmes.

L'invention concerne également des compositions pharmaceutiques injectables, stériles ou stérilisables pour l'administration tant par voie intraveineuse qu'intramusculaire ou sous-cutanée.

65 Ces solutions renferment avantageusement de 10 à 150 mg/ml environ de principe actif lorsqu'elles sont

destinées à l'injection par voie sous-cutanée ou de 10 à 100 mg/ml environ, lorsqu'elles sont destinées à l'injection intraveineuse ou à la perfusion.

A titre indicatif, afin d'illustrer l'invention, on indique, ci-après, un exemple de posologie utilisable chez l'homme : cette posologie comprend, par exemple, l'administration au patient d'environ 500 mg/prise, par voie sous-cutanée, deux à trois fois par jour. Par voie intraveineuse, on administre environ 1000 mg/j, sachant que, par perfusion, les quantités injectées peuvent être de plusieurs dizaines de ml. Ces administrations sont effectuées de manière discontinue à intervalles réguliers, ou continues par perfusion.

L'invention concerne encore les réactifs biologiques dont les principes actifs sont constitués par les compositions de fragments d'héparine telles que définies plus haut. Ces réactifs biologiques peuvent être utilisés comme références ou étalons dans des études comparatives dans différents systèmes physiologiques dans la régulation desquelles les GAGs sont impliqués.

D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaîtront dans les exemples qui suivent et en se référant aux figures 1 à 5,

- les figures 1 et 3 d'une part et 2 et 4 d'autre part, représentant les courbes HPLC respectivement d'un mélange de dépolymérisation réduit et d'une composition selon l'invention,
- la figure 5, le spectre RMN du ^{13}C d'une composition selon l'invention.

EXEMPLE 1 : Procédé d'obtention d'une composition de fragments d'héparine.

1/ - Coupure des chaînes d'héparine à l'aide d'acide périodique

10 g d'héparine injectable de mucus de porc, sous forme de sel de sodium, titrant 157 ul/mg dans le dosage Codex et 155 u/mg dans le dosage anti-facteur Xa de Yin et al; sont mis en solution dans 250 ml d'eau déminéralisée à 4°C. Le pH de la solution est ajusté à 5,0 par de l'acide chlorhydrique concentré. 10 g de métaperiodate de sodium (NaIO_4 , PM : 213,89) en solution dans 250 ml d'eau déminéralisée à 4°C sont ajoutés sous agitation modérée. Le pH de l'ensemble est ajusté à 5,0 par de l'acide chlorhydrique concentré. La solution est abandonnée 24 heures, à l'obscurité, en chambre froide à + 4°C.

2/ - Elimination du périodate résiduel

On répartit ensuite la solution réactionnelle dans 3 boyaux de dialyse NOJAX 40^R, (porosité de 3 à 4000 Da) et on la soumet à une dialyse 15 heures contre de l'eau déminéralisée courante.

3/ - Dépolymérisation en milieu basique

Aux 780 ml de solution obtenue après dialyse, sont ajoutés 16 ml de soude 10 N, et l'ensemble est soumis à agitation 3 heures à température ambiante (de l'ordre de 18-21°C).

4/ - Réduction

500 mg de borohydrure de sodium (NaBH_4 , PM : 37,83) sont alors ajoutés et la solution est agitée de nouveau 4 heures à température ambiante. Son pH est ensuite amené à 4 à l'aide d'acide chlorhydrique concentré. Après 15 minutes d'agitation, le pH est ajusté à 7 à l'aide de soude concentrée.

Aux 820 ml de solution ainsi obtenue sont ajoutés 16,4 g de NaCl puis 1270 ml d'éthanol.

L'ensemble est laissé au repos 3 heures, puis centrifugé à 2500 t/minute pendant 20 minutes.

Le précipité est recueilli, remis en suspension dans 200 ml d'éthanol pur, broyé à l'Ultra-Turrax^R et finalement récupéré par filtration sur buchner fritté.

Il est alors séché sous vide à 40°C pendant 5 heures.

On récupère ainsi 8,9 g de produit intermédiaire ayant les propriétés suivantes :

- dosage Codex : 8 ul/mg
- dosage APTT : 7 ul/mg
- dosage Anti-Xa : 8 u/mg

La répartition moléculaire de la composition est rapportée sur la figure 1 qui correspond à la courbe HPLC déterminée dans les conditions évoquées page 6.

5/ - Fractionnement alcoolique

Ces 8,9 grammes sont dissous dans environ 120ml d'eau déminéralisée à température ambiante. On ajoute 1,78 grammes de NaCl et le pH de la solution est abaissé à 3,5 à l'aide d'acide chlorhydrique. Le volume de la solution est ajusté à 178 ml à l'aide d'eau déminéralisée. 151 ml d'éthanol pur sont ajoutés sous agitation. L'agitation est maintenue 15 minutes après la fin de l'addition puis l'ensemble est laissé au repos 10 heures, à température ambiante.

Le précipité formé est recueilli par centrifugation 20 minutes à 2500 t/min. Il est remis en suspension dans 150 ml d'éthanol pur, broyé à l'Ultra-Turrax, récupéré par filtration sur buchner fritté, lavé par 300 ml d'éthanol pur et finalement séché sous vide à 40°C pendant 24 heures.

On récupère ainsi 5,0 g sous forme de poudre blanche 5,0 g du produit IC 1772 ayant les caractéristiques suivantes :

- titre Codex : 11 ul/mg
- titre APTT : 9 ul/mg
- titre Anti-Xa : 12 u/mg

La distribution moléculaire de la composition obtenue apparaît à l'examen de la figure 2 qui correspond à la courbe HPLC, déterminée dans les conditions ci-dessus.

Analyse en RMN du ^{13}C

5 Le spectre RMN pour le carbone 13 est représenté sur la figure 5. Ce spectre a été réalisé sur une solution, du composé dissous dans de l'oxyde de deutérium, à 25MHz, à 35° C. Les déplacements chimiques sont mesurés par rapport au méthanol (51,6ppm).

L'examen de ce spectre montre qu'il présente les signaux caractéristiques d'un enchaînement de disaccharides du type acide 2-O-sulfo- α -L-iduronique (1->4) 6-O-sulfo-N-sulfo- α -D-glucosamine (1->4).

10 On constate en particulier la présence des segments des carbones anomères, à 101,7 ppm (acide 2-O-sulfo- α -L-iduronique) alors que les signaux caractéristiques des acides D-glucuronique et L-iduronique (104,5 ppm) non sulfatés ne sont pas présents, contrairement au spectre d'une préparation d'héparine dans laquelle ils peuvent représenter jusqu'à 30 à 40% du total des signaux des acides uroniques.

Dans la région des C-2 de glucosamine, seul le signal à 60,5 ppm (C-2 de la N-sulfo-glucosamine) est présent. Le signal caractéristique de la N-acétyl-glucosamine (56,4 ppm) est à peine décelable alors qu'il figure dans l'héparine de départ.

15 Dans la région des C-6 de glucosamine (62,5 pour C-6-OH et 69 pour C-6-OS). On constate la présence des deux signaux des espèces non sulfatée et sulfatée.

Il est important de noter que le rapport d'intensité des signaux à 99,4 ppm et 101,7 ppm est égal à 1 ce qui confirme la seule présence d'acide 2-O-sulfo-L-iduronique.

20 On détecte la présence de quelques résidus de N-acétyl-glucosamine. De même, le signal du NHAc (24,6 ppm) apparaît.

Analyse conductimétrique:

25 Le degré de sulfatation déterminé par conductimétrie est de 2,3. Le nombre de charges par unité disaccharidique est de 3,3.

EXEMPLE 2:

30 1/ - 200 g d'héparine injectable, sel de sodium, titrant 154 ul/mg dans le dosage Codex et 158 u/mg dans le dosage anti-facteur Xa sont mis en solution dans 5 litres d'eau déminéralisée, à + 4° C.

Le pH de la solution est ajusté à 5,0 par HCl concentré. On ajoute alors sous agitation modérée : 200 g de metaperiodate de sodium en solution dans 5 litres d'eau déminéralisée à + 4° C. Le pH de l'ensemble est de nouveau ajusté à 5,0 par HCl concentré.

35 La solution obtenue est laissée 24 heures à l'obscurité, en chambre froide + 4° C, sous agitation modérée.

2/ - Elle est ensuite répartie dans 50 boyaux de dialyse et dialysée 14 heures contre de l'eau déminéralisée courante, à température ambiante.

3/ - A l'issue de cette dialyse, on récupère 14,5 litres de solution à laquelle on ajoute 116 g de soude pure en pastilles. On agite la solution ainsi obtenue 3 heures à température ambiante.

40 4/ - 10 g de borohydrure de sodium sont ensuite ajoutés et l'agitation est poursuivie pendant 4 heures.

Le pH de la solution est abaissé à 4 à l'aide d'HCl concentré, pendant 15 minutes, puis il est de nouveau réajusté à 7 par de la soude concentrée;

Le volume de la solution ainsi obtenue est de 15,2 litres. On ajoute alors 304 grammes de NaCl puis 22,8 litres d'éthanol.

45 L'ensemble est laissé au repos 48 heures à température ambiante. Le surnageant limpide est siphonné, le précipité est recueilli, remis en suspension dans 3 litres d'éthanol pur, broyé à l'Ultra-Turrax, et récupéré par filtration sur verre fritté.

Il est finalement séché sous vide à 40° C pendant 15 heures.

On récupère 181 grammes de fragments d'héparine ayant les caractéristiques suivantes :

50 - dosage Codex : 10 ul/mg

- dosage APTT : 9 ul/mg

- dosage Anti-Xa : 9 u/mg

répartition moléculaire : voir figure 3.

5/ - Ces 181 grammes sont dissous dans environ 3 litres d'eau déminéralisée, à température ambiante.

55 On ajoute 36,2 grammes de NaCl et le pH de la solution est ajusté à 3,5 par HCl concentré.

Le volume de la solution est ajusté à 3,62 litres à l'aide d'eau déminéralisée. On ajoute sous agitation modérée 3,077 litres d'éthanol pur. L'agitation est maintenue 15 minutes après la fin de l'addition et l'ensemble est laissé au repos 10 heures à température ambiante. Le précipité formé est recueilli par centrifugation 20 minutes à 2500 t/min. Il est remis en suspension dans 2 litres d'éthanol pur, broyé à l'Ultra-Turrax, récupéré par filtration sur fritté, lavé par 3 litres d'éthanol pur et finalement séché sous vide, à 40° C, pendant 24 heures.

On obtient finalement 104 grammes de poudre blanche ayant les caractéristiques suivantes :

60 - titre Codex : 13 ul/mg

- titre APTT : 10 ul/mg

65 - titre Anti-Xa : 13 u/mg

répartition moléculaire : voir figure 4.

EXEMPLE 3:

1/ - Coupure des chaînes d'héparine à l'aide d'acide periodique

45 g d'héparine injectable de mucus de porc, sous forme de sel de sodium, sont mis en solution dans 600 ml d'eau déminéralisée. 18 g de métaperiodate de sodium en solution dans 200 ml d'eau déminéralisée, à 5°C, sont ajoutés sous agitation modérée. On ajuste le pH à 5 par addition de HCl concentré et le volume réactionnel est amené à 900 ml avec de l'eau distillée. La solution est maintenue pendant 24 à 26 heures, à l'obscurité, en chambre froide (0-10°C). Le précipité formé est éliminé par filtration.

2/ - Elimination du periodate résiduel

Les 900 ml de la réaction d'oxydation de l'héparine sont percolés sur une résine échangeuse d'ions Amberlite IRA 400, Cl⁻ (Rohm and Haas Company, USA) ayant un volume de 1/8ème du volume réactionnel (110 ml), en 2 heures.

La colonne est rincée par 225 litres d'eau déminéralisée. Ce rinçage est combiné à la solution percolée. On obtient ainsi 1125 ml de solution débarrassée du periodate et de l'iodate. L'absence de periodate est contrôlée par titrimétrie. La courbe de titration de 5 ml de la solution d'oxyhéparine par 2,5 ml de soude 1 N permet de visualiser l'absence de periodate. Le periodate en solution se traduirait par une inflexion caractéristique pour un pKa d'environ 7,8.

3/ - Dépolymérisation en milieu basique

La bêta-élimination est initiée en ajoutant de la soude 10 N par étapes jusqu'à obtention d'un pH de 11,5. La réaction se poursuit pendant 1 heure à température ambiante (18-23°C) sous agitation.

4/ - Réduction

On ajoute alors du borohydrure de sodium à raison de 10 g par 100 g de matière première engagée.

Cette réduction est réalisée pendant au moins 3 heures sous agitation. L'agent réducteur en excès est ensuite éliminé par addition de 25 g/l de NaCl puis le pH de la solution est ajusté à 4 à l'aide de HCl concentré. La solution est ensuite ajustée à un pH neutre à l'aide de NaOH concentrée.

On précipite le produit en ajoutant 1,5 volume d'éthanol pur. Le précipité est décanté pendant 48 à 72 heures, puis déshydraté à l'éthanol et séché sous vide à 40°C pendant 12 heures.

5/ - Fractionnement alcoolique

Le produit est repris dans de l'eau déminéralisée (180 ml pour 10 g d'héparine engagée). On ajoute 2g de NaCl pour 10 g. Le pH est ajusté à 3,5 et la solution complétée en eau déminéralisée au volume de 200 ml pour 10 g engagés.

On ajoute 0,85 volume d'éthanol pur sous agitation lente. Le précipité est laissé à decanter pendant 48 à 72 heures. Le précipité est repris, déshydraté à l'éthanol pur, broyé à l'Ultra-Turrax[®] et séché à 40°C. Le produit se présente sous forme d'une poudre blanche. Le produit soluble dans l'alcool a été analysé en HPLC. On a constaté que les oligosaccharides ont un poids moléculaire moyen de l'ordre de 3500.

6/ - Purification

Le produit obtenu à l'étape précédente est mis en solution à 5% dans de l'eau déminéralisée et est purifié sur une colonne échangeuse d'anions Amberlite IRA 400, OH⁻ (1/10^e du volume réactionnel).

Le produit est ensuite testé pour ses caractéristiques :

- Taux de sulfatation (déterminé selon Helbert J.R. et Marini M.A., Biochemistry, 1963, 2, 1101-1106).

Le rapport SO₃/COO⁻ est de 2,2 à 2,4.

- Activités anti-IIa et anti-Xa :

- TCK (1) : 4 u/mg

- USP (2) : 13 u/mg

Activité anti-IIa (3) : 12 u/mg

- Activité anti-Xa (4) (Yin et Wessler) : 8 u/mg

- Activité anti-Xa (sur substrat chromogène

S 2222 en système purifié) : 1 u/mg

Les références des systèmes utilisés pour effectuer les mesures sont les suivantes :

(1) : R.R. Proctor et S. Rapaport - Ann. J. Clin. Pathol., 1961, 16, 212-219.

(2) : XXI^e Pharmacopée américaine.

(3) : Mesurée par l'allongement du temps de thrombine.

(4) : E.T. Yin, S. Wessler, J.V. Butler - J. Lab. Clin. Med., 1973, 81, 298-310.

MISE EN EVIDENCE DE CYCLES D'ACIDES URONIQUES OUVERTS ENTRE C2 et C3

La dégradation de Smith à pH 3 et 100°C pendant 1 heure d'une solution à 5% d'IC 1772 provoque la coupure spécifique des chaînes oligosaccharidiques au niveau des acides uroniques ouverts entre C2 et C3. Il en résulte une baisse du poids moléculaire moyen du produit, observée par gel filtration sur TSK 2000 avec

détection réfractométrique.

Les résultats sont exprimés de la manière suivante :

- Mna représente le "number average molecular weight" tel que défini par W.W. YAU, J.J. KIRKLAND et D.D. BLY (in Modern size-exclusion liquid chromatography, Wiley Interscience Publication) du produit testé tel que;
- Mnb représente le "number average molecular weight" après que l'on ait procédé à la dégradation de Smith comme indiqué ci-dessus;
- (Mna/Mnb) - 1 donne le nombre de sites sensibles à cette dégradation de Smith par chaîne oligosaccharidique, ce qui équivaut au nombre d'acides uroniques ouverts entre C2 et C3.

L'essai a été réalisé sur deux lots de produits IC 1772 :

10

	P 46 VH	P 55 VH
Mna	5503	5573
Mnb	3896	3745
(Mna/Mnb) - 1	0,4	0,5

20

On constate donc que, dans les conditions de l'analyse IC 1772 contient un acide uronique ouvert toutes les deux chaînes, au moins.

25

EFFET ANTICOAGULANT DE IC 1772 EN PLASMA HUMAIN

On rapporte, ci-après, les résultats obtenus concernant :

1. les activités anti-IIa et anti-Xa, in vitro, dans différents systèmes.
2. les temps de coagulation par la thrombine (TCT).

30

1/ - Activités anti-IIa et anti-Xa, in vitro

35

ESSAI	IC 1772 ug/mg	Héparine Standard ug/mg
TCK ¹	10	160
USP ²	13 - 15	160
Activité anti-IIa ³	16	160
Activité anti-IIa (sur substrat chromogène S 2238 en système purifié)	36	160
Activité anti-IIa (sur substrat chromogène S 2238 en système plasmatique)	1	160
Activité anti-Xa ⁴ (Yin et Wessler)	12 - 15	160
Activité anti-Xa (sur substrat chromogène S 2222 en système purifié)	2 - 3	160
Activité anti-Xa (sur substrat chromogène S 2222 en système plasmatique)	5 - 10	160

65

Les références des systèmes utilisés pour effectuer les mesures sont les suivantes :

- 1/ R.R. Proctor et S. Rapaport - Ann. J. Clin. Pathol., 1961, 36, 212-219,
 2/ XXIème Pharmacopée américaine
 3/ Mesurée par l'allongement du temps de thrombine
 4/ E.T. Yin, S. Wessler, J.V. Butler, J. Lab. Clin. Med., 1973, 81, 298-310.

2/ -TCT:

On rapporte dans le tableau 1 ci-après, les résultats sous forme de temps de coagulation exprimé en secondes, de 3 essais effectués avec les 3 types de plasmas utilisés pour étudier l'activité APTT. Le contrôle est effectué en milieu plasmatique normal. Les résultats correspondent à la moyenne de deux essais indépendants.

TABLEAU 1

µg/ml	Plasma normal	Plasmas déplétés en		
		ATIII	HC II	ATIII et HCII
0	22	20	20	20
2, 5	36	26	24	22
5	110	51	27	22
10	300	300	40	22

On constate aux doses de 5 et surtout 10 µg/ml un allongement du temps de thrombine qui semble dépendre de HCII.

- INHIBITION DE LA PROLIFERATION DES CELLULES MUSCULAIRES LISSES (CML) IN VITRO.

Modèle expérimental:

Les cellules musculaires lisses (CML) proviennent d'un segment abdominal de l'aorte de rat Sprague Dawley. De petits morceaux de média sont mis en culture en milieu RPMI-1640 additionné de 20% de sérum de veau foetal (SVF). Au bout de 1 à 2 semaines, les CML migrent hors des tissus et commencent à proliférer.

5-8.10³ CML sont mises en culture dans des plaques multi-puits. Après 24 heures, on arrête leur croissance par un lavage suivi de l'addition de milieu RPMI + 2% de plasma déplaqueté (ou RPMI + 0,4% de SVF) pendant 72 heures.

Les cellules sont alors replacées pendant 5 à 7 jours en milieu RPMI additionné de 20% de SVF avec ou sans le composé à tester, ce dernier à différentes concentrations.

La croissance nette des CML, dans les essais témoins ou additionnés des produits à tester, est obtenue en soustrayant le nombre de cellules au départ du nombre de cellules à la fin de l'expérience (mesure en duplicate par compteur Coulter).

Le % d'inhibition est donné par la formule suivante :

$$\% \text{ d'inhibition} = \left[1 - \frac{\text{croissance nette des cellules testées}}{\text{croissance nette des cellules témoins}} \right] \times 100$$

(voir Castellot et al., J. Cell. Biol., 102, 1986, 1979-1984).

Les résultats obtenus selon la concentration de IC 1772 en culture sont les suivants (à titre comparatif, on rapporte les valeurs d'inhibition obtenues avec l'héparine).

	<u>Quantité de produit</u>	<u>Inhibition</u>	
		IC 1772	Héparine
5	1 µg/ml culture	25%	20%
	10 µg/ml "	45%	60%
	100 µg/ml "	70%	80%

10

On constate une activité dans ce modèle expérimental très proche de celle de l'héparine standard.

15 - INHIBITION DE LA PROLIFERATION DES CELLULES MUSCULAIRES LISSES (CML) IN VIVO : MODELE DU CATHETER BALLON.

Modèle expérimental:

20 L'expérience est menée sur des rats mâles Sprague Dawley âgés de 5 mois et pesant environ 500 g. Les animaux sont anesthésiés et l'endothélium de l'artère carotide gauche est dénudé par le passage intraluminal d'un cathéter ballon à embolectomie introduit dans la branche externe de la carotide.

Le produit à tester ou une solution témoin stérile est administré en infusion continue dans de la solution lactosée de Ringer dans la veine jugulaire gauche (utilisation d'une pompe osmotique à infusion (Alzet) placée sur le dos de l'animal). Le traitement est poursuivi pendant 4 semaines à raison de 2,5 ul/heure. La dose administrée a été de 1 mg/kg/heure.

25 Après 28 jours les animaux sont anesthésiés et les artères carotides prélevées. A 17, 9 et 1 heure avant l'anesthésie, les animaux reçoivent une injection intrapéritonéale de thymidine tritiée.

Les résultats sont exprimés par le contenu en DNA dans les carotides droite (CD) lésées et gauche (CG) non lésées selon le mode de calcul suivant :

30

$$35 \quad \text{Inhibition (\%)} = \left[1 - \frac{\text{DNA}^* \text{ animaux traités}}{\text{DNA}^* \text{ animaux contrôle}} \right] \times 100$$

$$40 \quad \text{DNA}^* = \frac{\text{DNA}_{CG} - \text{DNA}_{CD}}{\text{DNA}_{CD}}$$

45

(voir A.W. Clowes et M.M. Clowes, Labor. Investig.,
50 1985, 52 (6), 612-616).

55 Résultats:

Dans un premier essai portant sur 10 animaux, on constate avec le produit testé IC 1772 une inhibition proche de celle de l'héparine d'environ 50%.

INHIBITION DU SYSTEME DU COMPLEMENT

60 L'héparine inhibe la génération de la C₃ convertase amplificatrice alterne du complément, en inhibant la formation du complexe bimoléculaire entre les protéines C_{3b} et B.

L'effet de l'héparine et du produit IC 1772 sur la liaison C_{3b}-B a été étudié en utilisant des protéines B marquées à ¹²⁵I (¹²⁵I-B) et des érythrocytes de moutons porteurs de protéine C_{3b} (E^SC_{3b}).

65 On appelle IC50 la concentration d'héparine ou de l'oligosaccharide testé nécessaire pour inhiber 50% de la formation du complexe C_{3b}-B.

Cette mesure est faite in vitro, dans un système de protéines purifiées.

Système expérimental

On incube des E³C_{3b} ($0,75-2,5 \times 10^7$) dans différentes concentrations de ¹²⁵I-B dans un tampon véronal contenant 0,1% de gélatine et 5mM Mg²⁺ pendant 30 mn à 30° C.

Des échantillons de 70 ul, en double pour chaque réaction, sont déposés sur 300 ul d'un mélange de dibutylphthalate (Merck-Clevenot, France) et dinonylphthalate (Coger, Paris) (7:3 v/v) dans des tubes de polypropylène de 0,5 ml.

Les tubes sont centrifugés pendant une minute à 8000 g dans un microfuge Beckman (Beckman, Paris), puis coupés juste au-dessus des précipités. La radioactivité du ligand lié est comptée.

Le produit IC 1772 a été dosé comparativement à l'héparine. Les résultats exprimés en IC 50 sont les suivants :

IC 1772 : 0,4 µg/ml

Héparine standard : 0,5 µg/ml

- Temps de saignement:

Le produit est administré chez le lapin par voie intraveineuse à la dose de 5 mg/kg, 15 minutes et une heure avant l'expérience.

Le modèle expérimental est celui de Cade, tel que décrit par Cade et al dans Thromb. Res. 35, 613-625, 1986.

Les essais effectués montrent que le produit n'entraîne aucune augmentation du temps de saignement à la dose de 5 mg/kg par voie intraveineuse.

- Etude de l'activité antithrombotique de IC 1772


Le modèle utilisé est le suivant :

Les animaux sont anesthésiés avec 70 mg/kg de Ketaset ® (Bristol Lab, Syracuse, NY) par voie intramusculaire. Par une technique chirurgicale, on isole une longueur de 2 cm sur les veines jugulaires droite et gauche. On injecte par voie intraveineuse dans la veine marginale de l'oreille le produit à tester, 5 minutes exactement avant l'injection d'une substance thrombogénique, par exemple un mélange de complexe concentré prothrombonique et de venin de vipère venum (PCC/RVV). Au bout de 20 secondes on effectue la ligature de la veine jugulaire, et après 10 mn de stase, on retire les segments de veine que l'on place dans le sérum physiologique, puis on évalue le degré de formation de caillot selon une échelle de 0 à 4 (4 représente un caillot unique sans érythrocytes libres) (FAREED, J. WALENGA, J.M., KIUMAR, 2. and ROCK, A. "A modified stasis thrombosis model to study the antithrombotic actions of heparin and its fractions. Sem. Thromb. Hemost. 11(2), 155-175, 1985).

IC 1772, administré par voie intraveineuse, à la dose de 1 mg/kg à un groupe de 10 lapins, a montré une très bonne activité antithrombotique chez tous les animaux.


Revendications

1. Composition d'héparines de bas poids moléculaire, pratiquement totalement dépourvue d'activité anticoagulante, caractérisée en ce qu'elle est essentiellement formée de fragments dépourvus d'enchaînements disaccharidiques du type acide uronique non sulfaté-glucosamine N-sulfate, ces fragments répondant à la formule générale I suivante :




dans laquelle

- X représente soit un motif acide iduronique sulfaté de formule II :




soit, à raison de 1 motif pour 2 chaînes au moins, un motif acide uronique (D-glucoronique ou


L-iduronique) non sulfaté, ouvert entre les carbones en positions 2 et 3, de formule III :



15 - Y représente un motif D-glucosamine de formule IV :



30 . R₁ étant un atome d'hydrogène ou un groupe -SO₃⁻
 . R₂, un groupe -SO₃⁻ ou -CO-CH₃, la proportion des groupes -SO₃⁻ étant d'environ au moins 90%, et
 . R₃, étant un groupe -SO₃⁻ ou un atome d'hydrogène, la proportion des groupes -SO₃⁻ étant d'environ au moins 70%,
 35 - R représente un atome d'hydrogène ou un motif :



50 . R₁ à R₃ étant tels que définis ci-dessus, et
 . R₄ représentant un atome d'hydrogène ou un résidu d'acide uronique,
 - R' représente soit un atome d'hydrogène, soit un motif acide uronique naturel, soit un résidu d'acide uronique modifié au cours de l'oxydation périodique et dont les fonctions aldéhydes ont été réduites en alcools,
 55 avec $7 \leq n \leq 15$ pour les espèces majoritaires, ce qui correspond à des chaînes de PM de 4800 à 9000 environ, et ses sels pharmaceutiquement acceptables.
 2. Composition selon la revendication 1, caractérisée en ce qu'elle présente en moyenne 3,3 charges par unités disaccharidiques.
 3. Composition selon l'une quelconque des revendications 1 ou 2, caractérisée en ce qu'elle présente, en HPLC déterminée avec une colonne TSK 2000 SW couplée à un détecteur photométrique 205 nm, en utilisant Na₂SO₄ 0,5M comme solvant, avec un débit de 1 ml/min :
 60 - un poids moléculaire moyen de l'ordre de 6000-7000 Da, plus précisément de 5800 à 7000 Da, notamment de l'ordre de 6000 Da, 70% des espèces étant comprises entre 4800 et 9000 daltons, et 90% entre 3600 et 11000 Da,
 65

- un poids moléculaire au sommet du pic de l'ordre de 6000 à 6500 Da, plus précisément de 5500 à 6500 Da, notamment de l'ordre de 5500 à 6000 Da,
- moins de 5% de chaînes inférieures à des dodécasaccharides,
- moins de 5% de chaînes au-delà de 11.000

4. Composition selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisée en ce que le spectre RMN est conforme à celui de la figure 5.

5. Composition formée de fragments d'héparine tels qu'obtenus par fractionnement, à l'aide d'alcool en présence d'un sel minéral, d'un mélange résultant de la dépolymérisation de l'héparine par action d'une base forte sur des chaînes d'héparine soumises au préalable à l'action de periodate, suivie d'une réduction des groupements aldehyde formés lors de l'oxydation periodique.

6. Composition selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, caractérisée en ce que les fragments qu'elle renferme se présentent sous la forme de sels de sodium, de potassium, de calcium ou de magnésium.

7. Procédé de préparation de compositions d'héparines de bas PM telles que définies dans la revendication 1, caractérisé en ce que :

a) on traite une solution aqueuse d'héparine à une concentration finale de 0,5 à 5% (p/v) avec de l'acide périodique à une concentration finale de 0,5 à 4% (p/v) à un pH de 4,5 à 6,5 à une température de 0 à 10° C;

b) on traite les chaînes d'héparine ainsi obtenues avec une base forte à une molarité finale en base de 0,1 à 0,3 N;

c) on traite les fragments de dépolymérisation ainsi obtenus avec un agent réducteur;

d) après élimination éventuelle de l'agent réducteur en excès, on précipite les fragments réduits après addition d'un sel minéral à l'aide d'un solvant alcoolique.

e) on traite une solution aqueuse du précipité ainsi obtenu additionné d'un sel minéral, par de l'alcool.

f) on récupère le produit précipité ainsi formé et on transforme éventuellement le sel correspondant à la base forte utilisée dans un autre sel pharmaceutiquement acceptable.

8. Procédé selon la revendication 7, caractérisé en ce qu'il comprend en combinaison les étapes suivantes :

- l'oxydation ménagée de l'héparine réalisée en faisant réagir de l'héparine, en solution aqueuse à une concentration finale de 0,5 à 5% (p/v) avec un sel de l'acide periodique à une concentration finale de 0,5 à 4% (p/v) à un pH situé entre 4, 5 et 6,5, à une température de 0 à 10° C, durant environ 15 à 48 h. à l'abri de la lumière,

- la dépolymérisation des chaînes d'héparine obtenues, par addition d'une base forte, telle que la soude, selon une quantité conduisant à une molarité finale en base de 0,1 à 0,3 N environ, à un pH supérieur à 11 environ, notamment compris entre 11 et 12, avantageusement de 11,2 à 11,6, de préférence de 11,5,

- la réduction des fragments de dépolymérisation à l'aide d'un agent réducteur et, après élimination, le cas échéant, de l'agent réducteur n'ayant pas réagi,

- la récupération des fragments d'héparine réduits par précipitation à l'aide d'un milieu solvant dans lequel ils sont insolubles,

- l'isolement des fragments recherchés par fractionnement à l'aide d'alcool, en présence d'un sel minéral, d'une solution aqueuse obtenue en remettant en solution dans l'eau le précipité précédemment isolé et en récupérant le précipité formé.

9. Procédé selon la revendication 7 ou 8, caractérisé en ce que dans l'étape d'oxydation periodique, on utilise l'héparine et le sel de l'acide periodique selon des quantités conduisant à des concentrations finales respectives de 1,5% à 5% et de 1,5 à 2,5% (p/v).

10. Procédé selon l'une quelconque des revendications 7 à 9, caractérisé en ce qu'on réalise l'étape d'oxydation periodique à pH 5, à 4° C.

11. Procédé selon l'une quelconque des revendications 7 à 10, caractérisé en ce que le sel de l'acide periodique est du metaperiodate de sodium.

12. Procédé selon l'une quelconque des revendications 7 à 11, caractérisé en ce que pour éliminer le periodate résiduel on effectue une dialyse avec des boyaux de dialyse ayant une porosité de 3 à 4000 Da, pendant environ 15 h.

13. Procédé selon l'une quelconque des revendications 7 à 12, caractérisé en ce que la récupération des fragments d'héparine réduits est réalisée en ajustant le pH à 7, puis après addition d'un sel minéral tel que du NaCl, en ajoutant 1 à 1,5 volume d'un solvant tel que l'éthanol.

14. Procédé selon l'une quelconque des revendications 7 à 13, caractérisé en ce qu'on dissout, à raison de 5% (p/v), les fragments précipités réduits d'héparine dans de l'eau additionnée d'un sel minéral, afin d'avoir une concentration finale de 1%, le pH de cette solution ayant été ajusté à 3,5, et qu'on ajoute 0,85 volume d'un solvant alcoolique tel que l'éthanol.

15. Composition pharmaceutique, caractérisée en ce qu'elle renferme une quantité efficace d'une composition selon l'une quelconque des revendications 1 à 6, en association avec un véhicule pharmaceutique.

16. Composition pharmaceutique selon la revendication 15, caractérisée en ce qu'elle se présente sous la forme d'une solution concentrée, injectable, stérile, contenant de 10 à 150 mg/ml environ, lorsqu'elle

0 287 477

est destinée à l'injection sous-cutanée, ou de 10 à 100 mg/ml environ, lorsqu'elle est destinée à l'injection intraveineuse ou à la perfusion.

17. Réactif biologique constitué par une composition selon l'une quelconque des revendications 1 à 6.

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

0287477




FIG. 1




FIG. 2

0287477




FIG.3




FIG.4

0287477




FIG. 5

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ **BLACK BORDERS**
- ☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- ☐ **FADED TEXT OR DRAWING**
- ☐ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- ☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**
- ☐ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- ☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**
- ☐ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- ☐ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- ☐ **OTHER:** _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.